



Bactifos

Přípravek na zkapalnění kejdy

Přípravek v tekuté formě

Bactifos je prostředek určený pro rozklad organických nečistot, usazenin a kalů v podroštových prostorách a jímkách. Působením této směsi bakterií a enzymů dochází ke zkapalnění pevného organického odpadu.

Před použitím je nutné Bactifos aktivovat:

Smíchejte 1l Bactifosu s cca 1-2 l vody (max 30 °C teplé) s hrstí šrotu. Směs nechte 8 až 12 hodin aktivovat v místnosti o minimální teplotě 20 °C. Před vlastní aplikací suspenzi opatrně promíchejte.

Návod na použití v chovech:

Aplikujte skrz rošty na jedno až dvě místa v kotci, a to co nejdále od výpusti kejdy. Pokud je již v podroštovém prostoru (jímcě) krusta, doporučujeme podpořit pronikání Bactifosu zajištěním dostatečné vlhkosti při současném promícháním obsahu jímky.


Aplikujte ideálně 1x týdně.

100 prasat/ 100 prasnic/ 50 telat/ 25 krav/ 25 mladých býků	Běžné použití	Výskyt krusty, přítomnost slámy
Startovací dávka (1. měsíc)	1 l	2 l
Udržovací dávka na měsíc	0,4 - 0,5 l	1 l po dobu 3-4 měsíců

V případě medikace zvířat antibiotiky, vyčkejte s aplikací týden po medikaci.

Návod na použití pro zkapalnění obsahu jímek:

Jímka o kapacitě 200-400 m ³	Běžné použití	Silná krusta, přítomnost slámy
Startovací dávka (1. měsíc)	1 l na 100 m ³	10 l na 5 -10 m ³ koncentrátu
Udržovací dávka na měsíc	0,5 l na 100 m ³	0,5-1 l na 100 m ³



Při běžném použití aplikujte aktivovaný **Bactifos** do jímky pomocí konve.

V případě vzniku silné krusty postupujte následovně:

1. Jímku co nejvíc vyprázdněte, popř. před vyprázdněním zřed'te dostatečným množstvím vody.
2. Odčerpejte 5-6 m³ kalu. Lze počkat, až se jímka částečně naplní.
3. Ponechte 1-2 dny fermentovat Bactifos v cisterně.
4. Vypusťte fermentovaný obsah (koncentrát) zpět do jímky a pokud možno, promíchejte.
5. Měsíc poté aplikujte dávku 1l na 100 m³.
6. V případě nutnosti můžete další měsíce aplikovat po dávkách 0,5 - 1l na 100 m³.

Složení:

Bakterie, enzymy, prebiotika a povrchově aktivní látky.

Bf